

## Première observation d'un Casse-noix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*) en forêt de Fontainebleau

**Lustrat P.** (2005) Observation d'un casse-noix moucheté en forêt de Fontainebleau. La voix de la forêt. Bulletin de l'Ass. Des Amis de la Forêt de Fontainebleau 2005/2 : 22.

Le 13 avril 2005, lors de prospection dans le rocher de Milly, mon attention est attirée par les cris d'un oiseau. Je reconnus ces cris comme appartenant au Casse-noix moucheté, mais cette espèce étant uniquement montagnarde, je cherchais à confirmer cette donnée. Peu de temps après, je parvins à observer l'oiseau à l'aide de mes jumelles, et je confirmai la découverte de cette nouvelle espèce pour la forêt de Fontainebleau.

L'oiseau volait dans la parcelle 606, secteur de la touche aux mulets à l'est de la plaine de Chanfroy. Des recherches les jours suivants ne m'ont pas permis de l'observer à nouveau.

Cette espèce vit habituellement dans les alpes franco-suissees, les massifs montagneux d'Europe centrale, ainsi que dans le sud de la Scandinavie. Cependant, en hiver, il se produit de grands mouvements érratiques.

Le casse-noix moucheté a le corps brun foncé, parsemé de taches blanches qui forment un masque clair qui contraste avec le bec noir. Sa queue est noire avec une barre terminale blanche et une grande zone blanche sous sa base.

Sa taille et sa silhouette sont proches de celles du Geai. Il s'en distingue en vol par la teinte uniformément sombre contrastant avec la zone blanche sous la queue et par l'absence de blanc au-dessus du croupion.

Ses cris: «kree kree kree» ou «kra kra kra» émis en série, sont moins criards que ceux du geai, mais possèdent une résonance caractéristique.

Les adultes dépendent toute l'année des noisettes dont ils font des réserves.

Chaque oiseau constitue en automne plusieurs milliers de caches contenant 1-3 noisettes et dispersées sur plusieurs hectares dans son domaine de reproduction ou à proximité. Une extraordinaire mémoire lui permet d'en retrouver les trois-quarts.

Le nid est construit le plus souvent contre le tronc d'un conifère (épicéa) à une hauteur variable (2-25 m). Le nid diffère de ceux des autres corvidés par l'épaisseur des couches de rembourrage composées de terre, de bois pourri, de bourre de lichen et de foin.

En Europe, le casse-noix moucheté est présent dans les massifs de basse et moyenne montagne, surtout dans les Alpes (15.000-65.000 couples).

**Pour en savoir plus...**

**Bulteel, C. (1992).** - Le Casse-noix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*) en Ardenne: Répartition, effectifs, cadre biogéographique. Aves 29: 1-36.

**Crocq, C. (1990).** - Le Casse-Noix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*). Lechevalier-Chabaud.

**Sorbi, S., Robbrecht, G., Steeman, C. & Wille, E. (1990).** - Observations de Casse-noix mouchetés (*Nucifraga caryocatactes*) nicheurs. Aves 27: 39-47.

**Tricot, J. (1968-69).** - L'invasion de Casse-noix en 1968. Aves 5: 146-157,184-188; 6:148-158.